

Doxycyclin 10 Tipps zur richtigen Einnahme



Frau Luftikus

- 1** (Stück) Tropfen | ml | Esslöffel | Teelöffel
- alle Minuten **X** mal täglich
 - alle Stunden mal wöchentlich
 - stündlich **X** mit etwas Nahrung
 - bei Bedarf ohne Nahrung
 - immer zur gleichen Uhrzeit
- Apothekengeflüster®

Tagesdosis als Einmalgabe!

Bitte lassen Sie mindestens **2 Stunden Abstand** zwischen der Einnahme dieses Arzneimittels und dem Verzehr von **calcium- oder magnesiumhaltigen Produkten** (z.B. Milchprodukte, Mineralwässer oder bestimmte Mittel gegen Sodbrennen).

Apothekengeflüster®

Ebenso
Magnesium,
Aluminium,
Eisen.

**Antiinfektivum
Antibiotikum
Antiphlogistikum**

Indikationen bspw.

- Bakterielle Infektionen**
Hals-Nasen-Ohren Infekte - Standardsubstanz
Gallenblasenentzündung
Infektionen des Magen-Darm-Traktes
Infektionen des Urogenitaltraktes
- Chlamydien
 - Mykoplasmen
 - Gonokokken
- Dermatosen
- Akne
 - Rosacea
 - Sonstiges
 - Borreliose
- Malaria-Prophylaxe laut WHO
usw.

Achtung, Vitaminräuber!

Dieses Arzneimittel kann einen Mikronährstoffmangel verursachen. Achten Sie auf sich. Wir beraten Sie gerne.

Ihre Apotheke

Apothekengeflüster®

Ausscheidung von Vitamin C erhöht.
Tipp: 200-500mg Vitamin C täglich einnehmen.
Tipp: Immunsystem stärken!

Bitte vermeiden Sie starke **Sonnenbäder und Solarienbesuche** während der gesamten Einnahmezeit dieses Arzneimittels, da Ihre Haut vorübergehend sonnenempfindlicher werden kann.

Apothekengeflüster®

Sonnenschutz!

Wechselwirkungen

Wirkstoffgruppen bspw.

- Antacida (Resorptionshemmung)
- Antikonvulsiva (Beschleunigter Abbau)
- Cephalosporine (Verminderte Wirksamkeit)
- Penicilline (Verminderte Wirksamkeit)
- Phenprocoumon (Wirkungsverstärkung)
- Sulfonylharnstoffe (Wirkungsverstärkung)

Liebe Anwenderin, dieses Arzneimittel **kann die Wirkung von hormonellen Verhütungsmitteln (die „Pille“) herabsetzen**. Bitte verwenden Sie bis zu Ihrem nächsten Zyklus ein weiteres, nicht-hormonelles Verhütungsmittel (z.B. Kondom). Bei Unklarheiten fragen Sie uns bitte.

Apothekengeflüster®

Gilt auch für bspw.
Nuvaring, Hormonspirale
und Co.!

Tipp: Kondome

Dieses Arzneimittel wirkt besser, wenn Sie es **mit viel Flüssigkeit** einnehmen (z.B. einem großen Glas Leitungswasser).

Apothekengeflüster®

Beugt Speiseröhren-Irritationen
und -tumoren vor!

Nicht zusammen mit folgenden
Wirkstoffen einnehmen bspw.

- Alkohol
- Aluminium (Antacida!)
- Ampicillin
- Amoxicillin
- Benzylpenicillin
- Calcium**
- Carbamazepin
- Cefaclor
- Cephalexin
- Cefadroxil
- Cefazolin
- Cefuroxim
- Ceftriaxon
- Cefixim
- Cefotaxim
- Cefopodoxim
- Ceftazidim
- Ceftibuten
- Cefepim
- Ceftarolinfosamil
- Ciclosporin (Tox!)**
- Colestyramin
- Eisen
- Flucloxacillin
- Glibenclamid
- Glimepirid5

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel in der von Ihrem Arzt verschriebenen Dosierung ein und **brauchen Sie - auch bei vorzeitiger Besserung - unbedingt den gesamten Packungsinhalt auf**. Sonst wächst die Gefahr einer weiteren Infektion und Resistenzbildung.

Apothekengeflüster®

Häufige Nebenwirkung **Durchfall**
Tipp: Probiotika, Elektrolyte.

Apothekengeflüster®

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. In der **Schwangerschaft** insbesondere ab der 16. Woche nur bedingt geeignet. Schädigung des Knochenwachstums, bleibende Zahnverfärbungen und Zahnschmelzdefekte.

Apothekengeflüster®

Nachhaltiger Umgang mit Doxycyclin

1. Antibiotika heilen nur **bakterielle** Infektionen. Bei viralen Infekten (bspw. Erkältungen) helfen sie **nicht**.
2. Eine falsche Einnahme führt zu tödlichen **Antibiotika-Resistenzen** bei allen Menschen.
3. Dieses Arzneimittel ist aufgrund der massenhaften Anwendung in Spuren im **Grundwasser** nachweisbar.

Apothekengeflüster®



Isotretinoin (**Pseudotumor cerebri!**)

- Magnesium (Antacida!)
- Methoxyfluran (Tox!)**
- Mezlocillin
- Phenoxymethylpenicillin
- Phenprocoumon
- Phenytol
- Piperacillin
- Primidon
- Rifampicin
- Theophyllin
- Warfarin

INFOGRAFIK

Einnahmefehler ausmerzen

1 Doxycyclin

Copyright: Apothekengeflüster® | Inhaberin: Kerstin Hinck | Im Mediapark 5 (3. Etage) | 50670 Köln

Apothekengeflüster übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen, auch wenn die Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Die angegebenen Anwendungsempfehlungen basieren auf dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Naturgemäße Änderungen sind von Kunden zum Zeitpunkt der Verwendung der Beratungshinweise in eigener Verantwortung zu ermitteln und zu berücksichtigen. Kontoverbindung Postbank Dortmund | IBAN: DE21 4401 0046 0191 3624 61

Wir wünschen gute und schnelle Besserung!